

Visite de la ruche n°

Page 1 – Description de l'extérieur de la ruche

Date :

Activité à l'entrée : aucune – faible – moyenne – forte

Obstacles à l'entrée : O/N

Grille d'entrée : aucune – été – hiver

Stabilité : O/N

Toit : O/N

Météo : soleil – pluie – nuageux – neige ou gel

Vent : aucun – faible – moyen – fort – tempête

Tiroir varroa : peu de varroa – varroa – beaucoup de varroa

Hausse (nombre) :

Page 2 – Evaluation de la colonie

Abeilles avec pollen : O/N **Abeilles mortes à l'entrée :** O/N

Reine vue : O/N **Présence de mâles :** O/N

Odeur : aucune – poisson – ammoniacale pourri – vinaigre fécale

Construction rayon : aucun – faible – moyen – forte

Force de la colonie : aucun – faible – moyen – forte

Capacité de nettoyage : aucun – faible – moyen – forte

Cellules royales : aucune amorce royale – cellule avec œuf, rien ne se passe - cellule avec œuf, suppression – cellule avec larve – essaimage

Nbre cadres neufs : **cadres de couvain :**
cadres de pollen : **cadres de miel :**

Tenue au cadre :

- très nerveuses, nombreuses en vol
- nerveuses, courent
- peu nerveuses, quittent le cadre, peu en vol
- calmes, restent sur le cadre
- très calmes, ne volent pas

Réserve suffisante jusqu'à la prochaine visite : O/N

Présence d'oeufs : O/N **si oui, nbre de jours :**

Douceur :

- très agressives, plus de 10 piques
- agressives, 4 à 10 piques
- moyennes agressives, 1 à 3 piques
- douces, pas de pique avec fumée
- très douces, pas de pique, pas de fumée

Poids de la ruche : kg

Page 3 : Evaluation sanitaire

Abeilles mortes : aucune – peu nombreuses – nombreuses – très nombreuses – toute la colonie

Observation devant la ruche – diarrhée : O/N

Observation hors de la ruche :

- abeilles dites noires
- agrippage sur herbe
- houspillage
- incapables de voler
- tremblantes
- saturé et bloqué d'abeilles

Observation au trou :

- larves momifiées blanches ou noires
- larves ou nymphes momifiées au trou de vol

Observation interne : diarrhée – abeilles dites noires – abeilles avec abdomen gonflé - ailes déformées ou abdomen raccourci – abeilles mortes tête dans les cellules – fausse teigne

Présence d'intrus : aucune – frelon asiatique – guêpe ou frelon – souris ou fourmis - sphynx à tête de mort ou cétoine – bondrée ou guêpier - ours ou renard ou blaireaux – autres

Maladie suspectée :

Page 4 : Traitement et nourrissage

Traitement (nature du produit ou marque) :

Quantité initiale :

Quantité restante :

Efficacité en % :

Nourrissage : candy (70/30) – sirop (50/50) – sirop (70/30)

Quantité : gr ou cl

Page 5 – Observation

Description de l'observation :